

89. 塩酸ドキシサイクリン (6152)

(内用)

再評価を終了した医薬品の効能・効果及び用法・用量等

	承認内容	再評価結果
効能・効果	<p>ブドウ球菌、レンサ球菌、肺炎球菌、炭疽菌、淋菌、肺炎桿菌、大腸菌、赤痢菌、コレラ菌、ペスト菌、ブルセラ属、クラミジア属、Q熱リケッチアのうちドキシサイクリン感受性菌株による下記感染症</p> <p>浅在性化膿性疾患： 扁桃炎、咽頭炎、智歯周囲炎、膿痂疹、膿瘍、フルンケル、カルブンケル、瘰癧、フレグモーネ、瘰癧、毛嚢炎、麦粒腫、眼瞼膿瘍、涙嚢炎、創傷並びに火傷感染、術後感染症</p> <p>深在性化膿性疾患： 乳腺炎、リンパ節炎、骨髄炎</p> <p>気管支炎、気管支肺炎、肺炎、気管支拡張症</p> <p>赤痢、コレラ、ペスト</p> <p>胆管炎、胆嚢炎</p> <p>尿路感染症： 腎盂炎、腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎</p> <p>前立腺炎</p> <p>子宮付属器炎、子宮内感染</p> <p>淋疾</p> <p>猩紅熱</p> <p>結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍</p> <p>中耳炎、副鼻腔炎、唾液腺炎</p> <p>オウム病</p> <p>炭疽</p> <p>ブルセラ症</p> <p>Q熱</p>	<p><適応菌種> ドキシサイクリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、肺炎桿菌、ペスト菌、コレラ菌、ブルセラ属、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、クラミジア属</p> <p><適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、尿道炎、淋菌感染症、感染性腸炎、コレラ、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙嚢炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯冠周囲炎、化膿性唾液腺炎、猩紅熱、炭疽、ブルセラ症、ペスト、Q熱、オウム病</p>
用法・用量	<p>通常成人は初日塩酸ドキシサイクリンとして1日量200mg（力価）を1回又は2回に分けて経口投与し、2日目より塩酸ドキシサイクリンとして1日量100mg（力価）を1回に経口投与する。なお、感染症の種類及び症状により適宜増減する。</p>	承認内容に同じ

販売名	会社名	販売名	会社名
パルドマイシン錠50	大洋薬品工業(株)	ラセナマイシン錠50mg	マルコ製薬(株)
ビブラマイシン錠	ファイザー(株)	ラセナマイシン錠100mg	マルコ製薬(株)
ピペラマイシン錠100	長生堂製薬(株)		