

配16. クロラムフェニコール・硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン (2639)

	承認内容	読替え後
効能・効果	<p>湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している下記疾患 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む）、熱傷 湿疹様変化を伴う膿皮症（感染性湿疹様皮膚炎、尋常性毛瘡、その他の膿皮症）</p>	<p><適応菌種> クロラムフェニコール／フラジオマイシン感性菌</p> <p><適応症> ・深在性皮膚感染症、慢性膿皮症 ・湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患： 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む）、 ・外傷・熱傷及び手術創等の二次感染</p>
用法・用量	<p>通常、1日1～数回直接患部に塗布又は塗擦するか、あるいは無菌ガーゼ等にのぼして貼付する。 なお、症状により適宜増減する。</p>	承認内容に同じ

販売名	会社名	販売名	会社名
クロマイーP軟膏	三共(株)	ハイセチンP軟膏	富士製薬工業(株)