

配26. 硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン (2647)

	承認内容	読替え後
効能・効果	湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している下記疾患 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む） 皮膚掻痒症（陰部・肛門部） 薬疹、中毒疹 虫さされ 紅斑症（滲出性紅斑） 湿疹様変化を伴う膿皮症（感染性湿疹様皮膚炎、尋常性毛瘡、その他の膿皮症）	<適応菌種> フラジオマイシン感性菌 <適応症> ・深在性皮膚感染症、慢性膿皮症 ・湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患： 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む）、皮膚そう痒症（陰部・肛門部）、薬疹・中毒疹、虫さされ、紅斑症（滲出性紅斑）
用法・用量	使用前に振とうし、患部から約10～15cm 離して1回1～2秒間、症状の程度により1日1～数回患部に噴霧する。 また、容器は立てて使用すること。	承認内容に同じ

販売名	会社名
エアゾリン D1	武田薬品工業(株)